

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogy gyermeke **MMR védőoltásra kötelezett** a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján iskolai kampányoltás keretében.

Az oltás várható időpontja:

Oltó orvos:

Szíveskedjék beküldeni a Gyermekek-egészségügyi kiskönyvet (oltási könyvet), ha még nem tette!

Ha a tanuló bármilyen okból a fenti címen és időpontban nem tud megjelenni, akkor szíveskedjék értesíteni, illetve ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni.

Jelezze, ha valamilyen akut vagy krónikus betegség áll fenn gyermekénél, illetőleg, ha bármilyen gyógyszerert szed!

A **kanyaró** (morbilli, **M**) 9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártyagyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra.

A **járványos fültőmirigy gyulladás** (mumpsz, **M**) 2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. Fiúknál a betegség szövődményeként jelentkező heregyulladás súlyos következményekkel járhat.

A **rózsahimlő** (rubeola, **R**) lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. A terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. **veleszületett rubeola** (fejlődési rendellenességekben jelentkeznek).

Az oltóanyag élő, gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és 1-2 napnál nem tartanak tovább. **A lázas állapot gondos megfigyelést és szükség esetén lázcsillapítást igényel.**

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke háziorvosát!

Kérem az alsó részt aláírva visszaküldeni az oltási könyvvel együtt!

Köszönettel:
iskolavédőnő

Kérem, ezt az alsó részt levágni, a fenti tájékoztatót pedig megtartani!



Gyermekek neve:

1 hónapon belül kapott-e oltást gyermeke iskolai kampányoltáson kívül? (kérem jelölni)

NEM IGEN:..... oltást.

Volt-e a gyermekének 6 héten belül műtétje? NEM IGEN
Van-e a gyermekének nagyfokú tojásérzékenysége? NEM IGEN
Volt-e korábban védőoltással kapcsolatos szövődménye? NEM IGEN:.....

Aláírással igazolom, hogy az MMR oltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen a megjelenésről szóló értesítést átvettem!

Dátum:.....

Szülő/Gondviselő aláírása:.....

Aláíró neve nyomtatott nagybetűvel is:

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogy gyermeke **MMR védőoltásra kötelezett** a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján iskolai kampányoltás keretében.

Az oltás várható időpontja:

Oltó orvos:

Szíveskedjék beküldeni a Gyermekek-egészségügyi kiskönyvet (oltási könyvet), ha még nem tette!

Ha a tanuló bármilyen okból a fenti címen és időpontban nem tud megjelenni, akkor szíveskedjék értesíteni, illetve ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni.

Jelezze, ha valamilyen akut vagy krónikus betegség áll fenn gyermekénél, illetőleg, ha bármilyen gyógyszerert szed!

A **kanyaró** (morbilli, **M**) 9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártyagyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra.

A **járványos fültőmirigy gyulladás** (mumpsz, **M**) 2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. Fiúknál a betegség szövődményeként jelentkező heregyulladás súlyos következményekkel járhat.

A **rózsahimlő** (rubeola, **R**) lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. A terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. **veleszületett rubeola** (fejlődési rendellenességekben jelentkeznek).

Az oltóanyag élő, gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és 1-2 napnál nem tartanak tovább. **A lázas állapot gondos megfigyelést és szükség esetén lázcsillapítást igényel.**

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke háziorvosát!

Kérem az alsó részt aláírva visszaküldeni az oltási könyvvel együtt!

Köszönettel:
iskolavédőnő

Kérem, ezt az alsó részt levágni, a fenti tájékoztatót pedig megtartani!



Gyermekek neve:

1 hónapon belül kapott-e oltást gyermeke iskolai kampányoltáson kívül? (kérem jelölni)

NEM IGEN:..... oltást.

Volt-e a gyermekének 6 héten belül műtétje? NEM IGEN
Van-e a gyermekének nagyfokú tojásérzékenysége? NEM IGEN
Volt-e korábban védőoltással kapcsolatos szövődménye? NEM IGEN:.....

Aláírással igazolom, hogy az MMR oltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen a megjelenésről szóló értesítést átvettem!

Dátum:.....

Szülő/Gondviselő aláírása:.....

Aláíró neve nyomtatott nagybetűvel is: