



Kötelező védőoltások az oktatási intézményben

6. évfolyamos tanulók:

- **MMR védőoltásra kötelezettek** a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján iskolai kampányoltás keretében.

A **kanyaró** (morbilli, **M**) 9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártya-gyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra.

A **járványos fültőmirigy gyulladás** (mumpsz, **M**) 2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. Fiúknál a betegség szövődményeként jelentkező heregyulladás súlyos következményekkel járhat.

A **rózsahimlő** (rubeola, **R**) lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. A terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. **veleszületett rubeola** (fejlődési rendellenességekben jelentkezik).

Az oltóanyag élő, gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és 1-2 napnál nem tartanak tovább.

A lázas állapot gondos megfigyelést és szükség esetén lázcsillapítást igényel.

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke háziorvosát!

- **dTap védőoltásra kötelezett** a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján iskolai kampányoltás keretében.

A védőoltás 3 súlyos betegség: a **torokgyík** (Diftéria, **D**), a **merevgörcs** (Tetanusz, **T**), a **szamárköhögés** (Pertusszisz **P**) ellen a szervezetben ellenanyag képződést indít el, ami védelmet biztosít ezen megbetegedésekkel szemben.

A **torokgyík** baktérium okozta fertőzőbetegség. A kórokozó főleg a légutakat, néha a bőrt támadja meg. A torokban, rendszerint a mandulákon, ritkán a gégében, vagy más nyálkahártyákon, esetleg a bőrön tapad meg és vaskos szürkéslepedéket hoz létre. Súlyos légzési nehézséget és esetenként fulladást okoz. A baktérium toxint (mérget) is termel, ami idegrendszeri károsodást, szívbetegséget, sőt még halált is okozhat.

A **merevgörcs** igen súlyos, magas halálozással járó betegség. A kórokozó földdel szennyezett seben keresztül jut be a szervezetbe és ott toxint (mérget) termel. A toxin súlyos idegméreg, amelynek hatására az izmok görcsös állapotba kerülnek.



A **szamárköhögés** kínzó köhögéssel, húzó, hangos belégzéssel járó, több hétig tartó bakteriális betegség, mely a légúti váladékcseppekkel terjed.

Az oltás helyén fellépő bőrpír, duzzanat beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság.

A lázas állapot gondos megfigyelést és szükség esetén lázcsillapítást igényel.

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke háziorvosát!